

T.TIP

Treating Trauma in Psychosis

Auteurs: S. Burger, A. Hardy, T. van der Linden, P. de Bont, B. van der Vleugel, T. Staring, A. van Minnen, A. de Jongh, C. de Roos, M. Marcelis, M. van der Gaag, D. van den Berg

Achtergrond

Angst voor verergering van klachten is een belangrijke drempel om traumabehandeling te geven, vooral bij mensen met comorbide psychose.¹

Methode



Design: Mensen ontvingen 8 sessies EMDR of 8 sessies Exposure.
Sample: 99 mensen met een psychotische stoornis en PTSS diagnose.²

Significante toename van klachten werd gedefinieerd als een toename van minsten 6.15 punten op de PTSS Klachtenschaal van baseline naar sessie 1, 2, 3 en/of 4 of tussen sessie 1 t/m 8.

Resultaten

Significante toename van PTSS klachten gedurende behandeling komt voor bij 32.3-46.5% en is niet gerelateerd aan behandel uitkomst of behandel drop-out.

Gemiddelde scores op de PTSS Klachtenschaal bij baseline (BL), gedurende iedere sessie (S) en na behandeling (PT) voor mensen met en zonder klachten-toename (exacerbation) gedurende behandeling.



Conclusie

Toename van PTSS klachten gedurende behandeling is veel voorkomend en géén reden om traumabehandeling te stoppen.

Referenties

1. Deacon, B. J., Farrell, N. R., Kemp, J. J., Dixon, L. J., Sy, J. T., Zhang, A. R., & McGrath, P. B. (2013). Assessing therapist reservations about exposure therapy for anxiety disorders: The Therapist Beliefs about Exposure Scale. *Journal of Anxiety Disorders*, 27(8), 772–780. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2013.04.006>
2. van den Berg, D. P. G., de Bont, P. A. J. M., van der Vleugel, B. M., de Roos, C., de Jongh, A., van Minnen, A., & van der Gaag, M. (2015). Prolonged exposure vs eyemovement desensitization and reprocessing vs waiting list for posttraumatic stress disorder in patients with a psychotic disorder: A randomized clinical trial. *JAMA Psychiatry*, 72(3), 259–267. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2014.2637>

Contact: Simone Burger s.r.burger@vu.nl