

Imaginaire Rescripting (ImRs) bij de behandeling van de obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) na CGT

F. Arslan-Unver, J. Krans, G.J. Hendriks & M. Kampman

Achtergrond

40% van OCS-patiënten profiteert onvoldoende van richtlijnbehandeling.

ImRs als alternatieve behandelmethode.

Resultaten van eerder onderzoek naar ImRs bij OCS zijn positief.¹⁻³


Design

Effectiviteitsstudie in de vorm van een gerandomiseerde single case-design met herhaalde metingen (within-subject time-series design).

Uitkomstmaten

OCS symptomen

Mastery & Kerncognities



Referenties

1. Veale D, Page N, Woodward E, Salkovskis P. Imagery Rescripting for Obsessive Compulsive Disorder: A single case experimental design in 12 cases. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2015;49(Pt B):230-6.
2. Tenore K, Basile B, Cosentino T, De Sanctis B, Fadda S, Femia G, et al. Imagery Rescripting on Guilt-Inducing Memories in OCD: A Single Case Series Study. Front Psychiatry. 2020;11:543806.
3. Maloney G, Koh G, Roberts S, Pittenger C. Imagery rescripting as an adjunct clinical intervention for obsessive compulsive disorder. J Anxiety Disord. 2019;66:102110.

Contact: Fatma Arslan Unver

F.arslan.unver@propersona.nl